

# Modřín opadavý



**Podtitulek:** nevýznamný alergen

**Česky:** Modřín opadavý

**Latinsky:** Larix decidua

**Anglicky:** European Larch

**Francouzsky:** Le Mélèze d'Europe; Mélèze commun

**Německy:** Die Europäische Lärche

**Řád:** Pinales

**Čeleď:** Pinaceae (borovicovité)

## **Intenzita:**

Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čvc Srp Zář Říj Lis Pro

**Znaky:** Opadavý jehličnatý strom vysoký až 40 m, úzce kuželovitý. Kmen pokrývá šedá, poté červenohnědá, zbrázděná a šupinatá kůra. Jehlice jsou čárkovité a měkké, až 4 cm dlouhé, rostou ve svazečcích po 15 až 40 na brachyblastech nebo jednotlivě, na podzim opadávají.

**Květ:** Samčí květy jsou žluté, převislé, samičí vzpřímené a karmínově červené, rostou v oddělených chomáčích na téže rostlině na jaře.

Velikost pylového zrna: 51-100 µm.

**Plod:** Vejčítá, hnědá, vzpřímená šiška, asi 4 cm dlouhá.

**Výskyt:** Jeho přirozeným prostředím jsou světlé a roztroušené horské lesy. Hojně vysazován zejména při okrajích lesů jako světlomilná jehličina. Jeho přirozený areál zahrnuje pohoří střední Evropy – Alpy a Karpaty a jejich předhůří. Izolovaná populace se nachází v severním Polsku. Výskyt na území České republiky je ze západu ohraničen Hrubým Jeseníkem, ovšem v současné době se zde jeho přirozené porosty nevyskytují. Vyskytují se zde však záměrně pěstované vyšlechtěné produkční či okrasné odrůdy.

**Další informace:** Dřevo tohoto opadavého jehličnanu se používá k výrobě nábytku, obkladů stěn či jako stavební dříví. Dříve se z něj též vyráběly bedny a kola. Vysoce ceněna je i pryskyřice modřínu, nazývaná benátský terpentýn.